

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Departamento de Recursos Naturais Renováveis

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA



BOLETIM

NÚMERO

8

CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO
DA
FLÓRULA DO ITATIAIA

Catálogo dos Pteridofitos **PTERIDOPHYTA**

FASC. 1

A. Castellanos

Colaboradores:

H. F. Martins

M. C. Vianna

J. P. P. Carauta



Contribuição para o Conhecimento da Flórida do Itatiaia

Catálogo dos Pteridofitos (PTERIDOPHYTA) Fasc. I

*A. Castellanos **

Colaboradores:

H. F. Martins

M. C. Vianna

J. P. P. Carauta

BOLETIM N° 8

* Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas

APRESENTAÇÃO


O presente Boletim nº. 8 do Parque Nacional do Itatiaia é fruto de um trabalho de cooperação entre esta instituição e o Centro de Pesquisas Florestais e Conservação da Natureza, do Estado da Guanabara conforme esclarece a Nota Explicativa adiante assinada pelo diretor do referido Centro.

Dado o interesse que apresentava não só para a Guanabara, como também para os pesquisadores do Brasil e do estrangeiro, o levantamento iniciado por aquela equipe, achamos conveniente tornar público esse trabalho que, de certa forma, surgiu quando com a ajuda do mesmo grupo, iniciamos a rearrumação do herbário do Parque.

Trata-se de tarefa paciente, tão necessária quanto descurada, pelas suas características pouco atraentes para a maioria dos pesquisadores. Sobretudo quando se considera a agradável preocupação do encontro de espécies novas que, no entanto nem sempre são tão novas, como tanto bem o atestam as extensas listas de sinônimos.


É nosso desejo que o trabalho, cuja divulgação ora se inicia com os Pteridofitos, possa continuar de forma regular, até cobrir todas as demais famílias botânicas que constituem a interessantíssima flora do Itatiaia, objeto das maiores atenções de botânicos notáveis.

Antonio Garcia
Administrador do P. N. I.



Doryopteris itatiayensis Christ

M. Chaves, nat.



NOTA EXPLICATIVA

Dada a localização do Centro de Pesquisas Florestais e Conservação da Natureza, nas províncias botânicas litorânea e costeira, achamos por bem nos valer dos trabalhos florísticos já publicados sobre o Itatiaia, Serra dos Órgãos e Caparaó, recopilando-os em catálogos ou flórulas que nos dêem uma idéia de conjunto de sua flora, para em seguida poder estabelecer comparação com a Guanabara. Assim, sabendo-se o que nesta existe e, por interpolação, o que existiu, será possível restaurar-se a paisagem que haja desaparecido e, dessa forma cumprir a missão a que se destina o Centro.

Iniciamos por Itatiaia por se tratar de um dos pontos mais estudados. Neste boletim, limitado pelo número de páginas disponíveis, a uma parte dos Pteridofitos, o trabalho se restringiu somente a um catálogo, porquanto sabemos que o Dr. A. C. Brade, grande conhecedor da flora local, está preparando uma revisão das espécies, de acordo com os modernos conceitos das famílias e gêneros. Por esse motivo seguiu-se o *Syllabus* (1954) no que diz respeito à ordem e amplitude dos gêneros.

Nas publicações seguintes, serão incluídas chaves e descrições sucintas das espécies, e mapas, de modo a constituir uma flórula.

O presente trabalho obedece à seguinte disposição: depois do nome científico, da sigla e da obra *princeps*, seguem-se os autores que, com o mesmo nome, citaram a espécie para Itatiaia. As obras são referidas em forma abreviada - uma vez que sua denominação por extenso poderá ser encontrada na Bibliografia a ser dada no final - e logo após a indicação da página, figura o *statio*, caso seja indicado; caso contrário, apenas a localidade. Desde que um autor acreditado citou a espécie para Itatiaia, foram fichados todos os trabalhos que a estudam, ainda que fora do Itatiaia, a fim de se ter a amplitude de sua distribuição geográfica. Nos binômios combinados, além disso, se dá o basônimo e sua obra *princeps*, bem como os autores que assim mencionaram a espécie para o local em estudo.

Por se tratar do catálogo de uma flôrula, limitou-se a consignar sómente os sinônimos com que tenha sido citada a espécie para a localidade em questão, ou únicamente aquele empregado em Martius, Fl. Bras., ainda que, aí, não figure expressamente o local objeto do presente trabalho. A ordem de citação dos autores é cronológica. Por último, indica-se a distribuição geográfica, a fim de permitir esboçar a área geográfica de cada espécie citada.

O croqui da zona da sede do Parque Nacional do Itatiaia, visa facilitar a localização de espécies cujo local de coleta faz referência apenas aos números dos lotes / da antiga colônia agrícola ou aos nomes de seus proprietários.

Não desejamos concluir sem fazer referência / particular à obra magistral do Dr. Brade, Boletim n. 5 do Parque Nacional do Itatiaia, verdadeiro modelo de trabalho fitogeográfico,

H. E. STRANG

Diretor do CFFCN

Catálogo dos Pteridofitos

(PTERIDOPHYTA)

Piano da Obra

Fasc. I

<i>Lycopodiaceae</i>	pg. 9	<i>Hymenophyllaceae</i>	pg. 30
<i>Selaginellaceae</i>	pg. 23	<i>Plagiogyriaceae</i>	pg. 39
<i>Isoetaceae</i>	pg. 25	<i>Dicksoniaceae</i>	pg. 39
<i>Ophioglossaceae</i>	pg. 26	<i>Cyathaceae</i>	pg. 41
<i>Marattiaceae</i>	pg. 26		Fasc. II
<i>Osmundaceae</i>	pg. 27	<i>Polypodiaceae</i>	
<i>Schizaeaceae</i>	pg. 27	<i>Bibliografia</i>	
<i>Gleicheniaceae</i>	pg. 28	<i>Indice</i>	

LYCOPODIACEAE

LYCOPODIUM L.

1. *L. acerosum* Swartz, Fl. Ind. Occ. 3 (1806) 1575. Sprin. in Mart., Fl. Bras. (1840) 111. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m. Sehnem, Pter. Riogr. (1961) 9: RS.

Urostachys acerosus (Sw.) Hert. ex Ness. in Arq. Bot. São Paulo 1 (1927) 399, tab. 18: RJ, Campos do Itatiaia, Agulhas Negras; MG, PE, SP; in Hoehne, Fl. BR. (1955) 55, fig. 39: RJ, Campos do Itatiaia, Agulhas Negras, 2.400 m s.m.; 2.000 m s.m.; SP, MG, PE.

Distr. Geogr.: PE, MG (Serra do Bispo, S^a do Papagaio), RJ (Serra dos Órgãos, Itatiaia), SP (Bocaina), RS.

2. *L. alopecuroides* L., Sp. Pl. 2 (1753) 1102. Spring in Mart., Fl. Bras. (1840) 114. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 41; MG. Dusén, Itat. (1905) 84: + 2.200 m s. m., Retiro do Ramos; + 2.350 m s. m., Pedra Assentada; + 2.500 m s. m., Pico Redondo; Amer. trop. e sub-trop. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 58; SP. Nessel, Lycop. (1927) 422, tab. 35: RJ, Itatiaia, MG, SP. Brade in Rodriguésia (1937) 114; SP. Capurro, Catál. (1940) 188: Argentina, Uruguai. Brade in Rodriguésia (1947) 29; ES. Hoehne in Rondon (1951) 120; MT. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Nessel, in Hoehne, Fl. Br. (1955) 94, fig. 77: RJ, Itatiaia, MG, SP, PR; U. S. A., S. Domingos, Colombia, Peru, Venezuela e Paraguai. Brade, Itat. (1956) 30, 33: + 2.000 m s. m. Legrand y Lombardo, Pter. (1958) 9: Uruguai. Sehnem, Pter. Riogr. (1961) 9: RS, U.S.A. até Argentina. Angely, Fl. Pter. (1963) 1: PR.

Distr. Geogr.: GO, MT (Campos Novos da S^a. do Norte), MG (S. Francisco, Ouro Preto, Cachoeira do Campo, S^a. Ouro Branco), ES (Alto Limoeiro), RJ (Itatiaia, S^a. dos Órgãos), SP (Mogi das Cruzes, Pico do Jaraguá, Butantá, Alto da Serra, Campos do Jordão, Cerqueira Cesar, Ilha Comprida, Lapa, Faxina, Campo Grande), PR (Jaguaraiaba), SC, RS, U. S. A., S. Domingos, Colombia, Venezuela, Peru, Paraguai Uruguai e Argentina.

3. *L. alopecuroides* L. var. *Juergensii* Rosenst. in Hedwigia 46 (1907) 165; RS. Nessel, Lycop. (1927) 428: MG, SP. Dutra, Pter. (1940) 65; RS. Nessel in Hoehne, Fl. Br. (1955) 96, fig. 79: RJ, Itatiaia, MG, SP.

Distr. Geogr.: MG (Caparaó), RJ (Itatiaia, S^a. do Órgãos), SP, RS (Bom Jesus, Caraúna, Cruz Alta).

4. *L. alopecuroides* L. var. *Nettoanum* Glaz. in Baker, Hand. Fern All. (1887) 19. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 41: MG; in Wettstein, Exped. (1908) 59: SP. Nessel, Lycop. (1927) 424, tab. 36: SP, MG, PR, MT. Hoene in Rondon (1951) 121: MT. Nessel in Hoehne, Fl. Br. (1955) 95, fig. 78 (★): RJ, Itatiaia: Lagoa das Prateleiras a 2.100 m s. m., nos pântanos; MG, SP, MT, PR. Angely, Fl. Pter. (1963) 1: PR.

Distr. Geogr.: MT. (Campos Novos da S^a. do Norte, Tapirapoã), MG (S^a do Saramenha, Barbacena, S^a. do Caraça, Ouro Preto, Curral Novo, S^a. do Lenheiro, Diamantina), RJ (Itatiaia), SP (Butantã, Ipiranga, Alto da Serra, Água Branca, Rio Grande, Campo Grande, Tietê), PR.

(★) Obs.: A fig. 78 in Hoeme, 1. c, representa o n°. 4.432 de A. Gehrt que nos parece diferente da tab. 36 in Nessel (1927) sob a mesma indicação.

5. *L. boliviannum* Rosenst. var. *teretiusculum* Rosenst. in Fedde, Repert. 11 (1912) 60: Bolivia.

Urostachys boliviannus (Ros.) Hert. ex Ness. var. *teretiusculus* (Ros.) Hert. ex Ness. in Lycop. (1927) 396: MT, RJ, Itatiaia, Retiro do Ramos; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 42: MT, RJ, Itatiaia Maromba a 1.000 m s. m.

Distr. Geogr.: MT (Cuiabá,) RJ. (Itatiaia); Bolivia.

6. *L. cernuum* L., Sp. Pl. 2 (1753) 1103. Dusén, Itat. (1905) 109: + 600 - 1700 m s. m.

Distr. Geogr.: Cosmopolita.

7. *L. cernuum* L. var. *Moritzii* K. Mueller in Bot. Zeit. (1861) 165. Nessel, Lycop. (1927) 445: RJ, S^a. do Itatiaia, SP, MG, PR, MT, PE; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 126, fig. 112: AM, BA, PE, MG, RJ, Itatiaia, MT, PR. Angely, Fl. Pter. (1963) 2: PR, AM-PR.

Distr. Geogr.: AM (Manaus), PE (Boa Vista), BA, MT. (Cuiabá), MG (S. João d' El-Rey), RJ (Itatiaia, S^a dos Órgãos), SP (Jaguaré,) PR (Ipiranga). Surinam, Guadalupe, África trop., Ceilão, India, China, Japão, Filipinas, N. Guiné.

8. **L. Christii** Alv. Silv. in Bol. Comm. Geog. Geol. Minas Geraes 5 II (1898) 117, tab. 1: MG. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 38: MG Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s. m., 71: Itatiaia e S^a dos Órgãos.

Urostachys Christii (Alv. Silv.) Hert. in Phil. Journ. Sci. 22 (1923) 179 (nomen). Nessel, Lycop. (1927) 379, tab. 2; MG; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 25, fig. 7: MG. RJ, S^a. do Itatiaia, 2.100 - 2.500 m s. m., PR. Angely, Fl. Pter. (1963) 3: PR.

Distr. Geogr.: MG (S^a do Papagaio, S^a do Picú), RJ (Itatiaia, S^a. dos Órgãos), PR.

Obs.: Nessel in Hoehne (1955) à pg. 26 aponta o nº 41 de Ule com a data V. 1894 mas à pg. 27 cita o mesmo nº. de Ule com a data II. 1894, sub var. *treitubensis*.

9. **L. clavatum** L. subsp. **aristatum** (H. B. ex Willd.) Spring in Flora 21 I (1838) 173; in Mart., Fl. Bras. (1840) 114

L. aristatum H. B. ex Willd., Sp. Pl. 5 (1810) 17. H. B. K., Nova Gen. Sp. Pl. (1815) 38: Silla de Caracas

L. clavatum L. var *aristatum* (H.B.K.) Nessel, Lycop. (1927) 439, tab. 40: MG; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 115, fig. 101: MG, SP, RJ, S^a do Itatiaia a 1.900 m s. m.

Distr. Geogr.: MG (Ouro Preto, S.^a do Bispo), RJ (Itatiaia), SP (rio Cotia). Antilhas, Costa Rica, Venezuela, Perú e Bolívia.

10. *L. clavatum* L. var. *Raddianum* Spring in Flora 21 I (1838) 172; in Mart., Fl. Bras. (1840) 114. Nessel, Lycop. (1927) 437, tab. 39 (*): MG, SP, RJ, S^a do Itatiaia, PR; in Hohne, Fl. Br. (1955) 113, fig. 99: MG, SP, RJ, Itatiaia a 2.200 m s.m.

Distr. Geogr.: MG (Caldas, Ouro Preto, Cristina), RJ (Itatiaia, Cantagalo, S^a dos Órgãos, Itaperussú), SP (Alto da Serra, Butantã, Campos do Jordão, Cabreúva, Cantareira, S Francisco dos Campos), PR.

(*) Obs.: O nº 198 in Lycop. (1927) tab. 39 sob a denominação acima, foi estampado in Hoehne (1955) fig. 98 sub *L. clavatum* var. *trichophyllum*.

11. *L. clavatum* L. var. *trichophyllum* (Desv.) Nessel in Arch. Bot. S. Paulo 1 (1927) 436: MG, SP; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 112, fig. 98 (Cfr. *L. clavatum* var. *Raddianum*): BA, MG, SP, RJ, S^a do Itatiaia, PR, RS. Angely, Fl. Pter. (1963) 3: PR.

L. tircophyllum Desv. in Ann. Soc. Linn. Paris 6 (1827) 184

Distr. Geogr.: BA, MG, RJ (Itatiaia, Cantagalo, S^a dos Órgão, Santa Madalena), SP (S^a da Cantareira, Pirituba, Butantã), PR (Boa Esperança), RS. Venezuela, Colombia, Costa Rica, S. Domingos.

12. *L. comans* Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 40: RJ, Itatiaia 2.300 m s.m. Dusén, Itat. (1905) 84: + 2.200 m s.m. Brade in Rodriguésia (1942) 37: RS, Itatiaia; (1949) 136, 141, 143: MG, RJ, Itatiaia 2.000-2.300 m s.m., SP, SC. Rizzini, Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Brade, Itat.

(1956) 33: + 2.000 m s.m., 71: Itatiaia, SP, SC. Sehnem, Pter. Riogr. (1961) 10: RS. Angely, Fl. Pter. (1963) 3: PR, MG, RS.

Urostachys comans (Christ.) Hert. ex Nessel, Lycop. (1927) 400, tab. 19: MG, S^a do Itatiaia a 2.100 m s.m., RJ, SC; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 57, fig. 41: MG, Itatiaia 2.100 m s.m., RJ, SP, SC.

Distr. Geogr.: MG. (Passa Quatro, S^a do Papagaio, S^a do Itatiaia ocidental), RJ (S^a dos Órgãos, Teresópolis, Itatiaia), SP (Boaçana, Campos do Jordão), PR, SC (S. Bento), RS.

Obs.: Ule n° 255 in Relat. (1895) sub *Lycopodium* sp. é o holotipo desta espécie. Glaziou n° 5225 é um paratípico.

13. *L. complanatum* L., Sp. Pl. 2 (1753) 1104. Spring in Mart., Fl. Bras. (1840) 116. Ule, Relat. (1895) 221: RJ, Itatiaia, orla das matas. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 42: MG, RJ, SC, RS. Dusén, Itat. (1905) 85: + 1850 m s.m. S^a Macieira: + 2.200 m s.m. Retiro do Ramos; + 2.000 m s.m. Macieira do Couto, Serra Miraflôres. Rosenst., Pter. (1907) 165: RS, SC, PR. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 58: SP. Nessel, Lycop. (1927) 441: RJ, S^a. do Itatiaia, MA, MT. Brade in Rodriguésia (1937) 116: SP. Dutra, Pter. (1940) 65: RS. Brade in Rodriguésia (1942) 39: RJ, Itatiaia; (1949) 136, 137: MG. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Brade, Itat. (1956) 26, 33: + 2.000 m s.m. Sehnem, Pter. Riogr. (1961) 10: RS. Angely, Fl. Pter. (1963) 3: PR.

Distr. Geogr.: MA, MT, MG (S^a Ouro Preto, S^a do Picú, Passa Quatro), RJ. (Itatiaia, S^a dos Órgãos), SP (Apiaí, Rio Grande, Campos do Jordão), PR (Lucena, Rio Negro), SG (S. Bento, Lajes, Blumenal, Joinville), RS (Bom Jesus, Farromesco, Sta. Cruz).

14. *L. complanatum* L. var. *thyoides* (H. B. ex Willd.) Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 42 (sub *thujooides*): MG, SC; in Wettstein, Exped. (1908) 58 (sub *thunyoides*): SP. Nessel, Lycop. (1927) 442; SP, RJ, Itatiaia, MG; Filipinas. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Nessel in Hoehne, Fl. Br. (1955) 120, fig. 107: AM, MG, SP, RJ, Itatiaia a 2.400 m s.m.; Filipinas. Brade, Itat. (1956) 33: ± 2.000 m s. m. Sehnem, Pter. Riogr. (1961) 10: R.S. Angely, Fl. Pter. (1963) 3: PR.

L. thyoides H. B. ex Willd., Sp. Pl. 5 (1810) 18. Nova Gen. Sp. Pl. (1815) 38: Silla de Caracas.

L. complanatum L. var. *tropicum* Spring in Mart., Fl. Bras (1840) 116. Beck in Itinera 2 (1888) 136: RJ. Itatiaia.

Distr. Geogr.: AM, MG (Ouro Preto, Itacolomi), RJ (Itatiaia, Serra dos Órgãos), SP (Rio Grande, Apiaí, Alto da Serra, Lageado, Campo do Jordão, Bocaina), SC, (Itajai), RS. Venezuela, Filipinas.

Obs.: Segundo Nessel, Lycop. (1927) 443, o n.º 254 de Ule refere-se a este taxon, citado para Ouro Preto em Minas Gerais. Este mesmo n.º é citado por Ule, Relat. (1895) 221, coletado no Itatiaia, entre rochedos.

15. *L. dichotomum* Jacq., Enum. Stirp. Vindob (1772) 314; Hort. Vindob. 3 (1776) 26, tab. 45. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 49: MG, SC. Rosenst., Pter. (1904) 234: SC. Dusén, Itat. (1905) 84: ± 2.200 m s.m.; Amer. trop.

Urostachys dichotomus (Jacq.) Herter in Beiheft, Bot. Centralbl. 2a. ser 39 (1922) 249 Nessel in Lycop. (1927) 412, tab. 29: GB, PR; in Hoene, Fl. Br. (1955) 73, fig. 57: GB, PR.

Distr. Geogr.: MG (Capivari), RJ (Itatiaia), GB (Corcovado) PR (Monte Alegre), SC (Blumenau, Joinville). América Tropical.

16. **L. eriostachys** Féé, Crypt. Vasc. Brés. 1 (1869) 224: RJ. *L. clavatum* L. var. *eriostachys* (Fée) Nessel, Lycop. (1927) 435: SP; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 114, fig. 100: SP, RJ, Itatiaia, Agulhas Negras.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia, S^a. dos Órgãos), SP (S^a da Cantareira).

17. **L. erythrocaulon** Féé Crypt. Vasc. Brés 2 (1873) 95. RJ Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 41: RJ, S^a do Itatiaia 2.300 m s.m. Dusén, Itat. (1905) 84: + 2.400 m s.m. Pedra Assentada, RJ. Brade in Rodriguésia (1949) 141, 143: Itatiaia 2.000-2.300 m s.m. SP, MG Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Brade Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m., 71: Itatiaia, RJ SP, Bolivia.

Urostachys erythrocaulon (Fée) Hert. ex Nessel, Lycop. (1927) 421, tab. 34: RJ, Itatiaia 2.300 m s.m., PS; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 90 fig 74: ibid.

Distr. Geogr.: MG (Passa Quatro,) RJ (Itatiaia, S^a dos Órgãos), SP (Bocaina); Bolivia.

18. **L. fastigiatum** R. Br. var. **assurgens** (Fée) Nessel. Lycop. (1927) 440: RJ, S^a do Itatiaia, MG, SC, MT, MA. Brade in Rodriguésia (1942) 38; RJ, Itatiaia. Nessel in Hoehne, Fl. Br. (1955) 118, fig. 105: MA, MG RJ, Itatiaia. Retiro do Ramos 2.200 m s.m.; Pedra Assentada a 2.300 m s.m.; SC Brade, Itat. (1956) 29, 30, 33: + 2.000 m s.m., 49, 57, 72: Itatiaia, SC, MT; Itatiaia. (1960) 209: RJ, MG, SC. Sehnem, Pter Riogr. (1961) 10: RS.

L. assurgens Fée, Crypt. Vasc. Brés. 2 (1873) 95, tab. 106, fig. 3. Christ. in Wettstein, Exped. (1908) 58: Itatiaia.

L. Paniculatum Nessel, Lycop. (1927) 440, tab. 41 (non Desv.): S² do Itatiaia, Retiro do Ramos.

Distr. Geogr.: MA, MT, MG (Caparaó), RJ (Itatiaia, S² dos Órgãos), SC (S. Bento), RS.

Obs.: O nº 300 de Ule. Relat. (1905) 221 corresponde a esta variedade, segundo Nessel.

19. *L. fastigiatum* R. Br. var. *Schumackerii* Hieron. ex Nessel. Baerl. (1939) 324; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 119, fig. 106: MG, RJ, Itatiaia, Agulhas Negras. Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m.; 49, 72: Itatiaia, MG; Itat. (1960) 209: MG

L. assurgens Fée var. *Schwackei* Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 41: MG, RJ, Itatiaia 2.100 m. s.m. Dusén, Itat. (1905) 85: MG, RJ, Itatiaia + 2.350 m.s.m.

Distr. Geogr.: MG (Caparaó), RJ (Itatiaia).

Obs.: Brade (1956) pág. 57 não mantém o critério citando *L. Schwackei* como se fosse espécie, quando foi descrito como variedade. Christ cita como paratipo de *L. assurgens* var. *Schwackei* o nº. 300 de Ule. Esse mesmo nº. para Nessel Lycop. (1927) 440 corresponde a *L. fastigiatum* var. *assurgens*.

20. *L. Inflexum* Alv. Silv. in Bol. Comm. Geog. Geol. Minas Gerais 5 II (1898) 118, tab. 2, fig. 1: MG. Brade Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m.; 72: Itatiaia, MG.

Urostachys inflexus (Alv. Silv.) Hert. ex Nessel, Lycop. (1927) 384: MG; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 32, fig. 15: MG, RJ, Itatiaia 2.400 m s.m.

20. *L. saururus* auct. plur. non Lam., Enc. Meth. 3
(1789) 653. Christ. in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900)
39: MG.

21. Distr. Geogr. MG (S^a. do Papagaio, S^a. do Cipó, Caparaó),
RJ (Itatiaia).

Obs.: O nº 253 de Ule, Relat. (1895) 221, corresponde
a esta espécie, segundo Nessel.

21. *L. Jussiaei* Desv. in Poir., Enc. Meth., Suppl. 3 (1813)
543 Dusén, Itat. (1905) 85. + 2.200 m s.m., Retiro
do Ramos, + 2.300 m s.m., Serra Miraflôres; Perú,
Jamaica. Brade in Rodriguésia (1942) 37, tab. 9: RJ,
Itatiaia; Itat. (1956) 49, tab. 4, map. 4: 2.200 m s.m.,
Pedra Assentada; 72: Equador, Colômbia, Venezuela,
Jamaica; Itat. (1960) 209.

L. scariosum Forst. var. *Jussiaea* (Desv.) Nessel,
Lycop. (1927) 444, tab. 42: RJ, Itatiaia, Retiro do
Ramos in Hoehne, Fl. Br. (1955) 122: RJ, ibid.; Ja-
maica, Colômbia, Venezuela, Equador, Perú e Chile.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia); Jamaica, Colômbia, Venezuela,
Equador, Perú e Chile.

22. *L. Luederwaldtii* (Nessel) in Brade, Itat. (1956) 33: +
2.000 m s.m. 57. 72 (? Ros.): endêmica.

Urostachys Luederwaldtii Nessel in Fedd, Repert. 36
(1934) 178 tab. 170: in Hoene, Fl. Br. (1955) 32, fig. 14:
RJ, Itatiaia, Agulhas Negras.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia).

Obs.: A fig. 14 in Hoehne, l. c., pág. 33 representa a es-
pécie acima sob o nº 17990 do Inst. Bot., que é es-
tampada na tab. 5 de Nessel, Lycop. (1927) sub:
L. saururus.

23. *L. pungentifolium* Alv. Silv. in Bol. Comm. Geog. Minas Geraes 5 II (1898) 119, tab. 4; MG. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 39: MG.

L. ouropretanum Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 39, tab. 4: MG, SC. Dusén, Itat. (1905) 84: RJ, Itatiaia, MG, SC.

Urostachys pungentifolius (Av. Silv.) Hert. ex Nessel, Lycop. (1927) 394, tab. 12-13: MG.

Urostachys reflexus (Lam.) Hert. var. *pungentifolius* (Alv. Silv.) Hert. ex Nessel, Baerl. (1939) 115; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 50, fig. 34: AM, BA, RJ, SP, MG.

Distr. Geogr.: AM (S^a do Norte, S. Gabriel), BA (S^a do Sincorá), MG (S^a do Papagaio; Ouro Preto, S^a Negra), RJ (Sta. Madalena, Itatiaia) SP (Alto da Serra).

24. *L. magellanicum* Swartz

Dusén, Itat. (1905) 85: + 2.200-2.300 m s.m.; Patágônia ocid., Terra do Fogo, Malvinas, Kergelen, N. Zelandia e Tasmânia.

Obs: Esta espécie não foi citada por autores posteriores.

25. *L. myrsinoides* Lam., Enc. Méth. 3 (1789) 654. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 40 (★); MG. Rosenst., Pter. (1904) 234: SC. Christ in Wettstein, Ex-ped. (1908) 58: RJ, SP. Brade in Rodriguésia (1949) 136: MG. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Brade, Itat. (1956) 26, 33: + 2.000 m s.m.

Urostachys myrsinoides (Lam.) Hert. in Fedde, Repert. 19 (1923) 166. Nessel, Lycop. (1927) 406, tab. 23: SP; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 65, fig. 50: SP, RJ.

Distr. Geogr.: MG (S. Francisco, Passa Quatro), RJ. (Pe-
trópolis, S^a dos Órgãos, Itatiaia), SP (Itapecirica Rio
Grande, Alto da Serra, Apiaí, Campo Grande), SC.
(Joinville).

(★) Obs.: Christ cita como sinônimo o *L. quadrangulare*
Spring.

26. ***L. quadrangulare*** Spring in Mart., Fl. Bras. (1840)
112, tab. 5, fig. 1. Brade in Rodriguésia (1951) 65:
SP. Rizzini, in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Brade,
Itat. (1956) 33: + 2.000 m. s.m.

Urostachys quadrangularis (Spring) Hert. ex Nessel,
Lycop. (1927) 404, tab. 22: MG, SP; in Hoehne,
Fl. Br (1955) 64, fig. 48: SP, RJ, Itatiaia (Pinheiral)
2.100 m s.m., MG.

Distr. Geogr: MG (Caparaó), RJ (S^a dos Órgãos, Itatiaia),
SP (Campos do Jordão, Bocaina).

27. ***L. reflexum*** Lam., Enc. Méth, 3 (1789) 653. Spring
in Mart., Fl. Bras. 1840) 109. Christ in Schwacke, Pl.
Nov. Min. (1900) 39: RJ, MG. Dusén, Itat. (1905) 84:
+ 1.850 m m.s., 1^a Macieira; Amer. trop. mont.. Mada-
gascar, Java. Sumatra. Christ in Wettstein, Exped.
(1908) 57: SP. Rizzini, in Arq. J. Bot. (1954) 225:
RJ Brade, Itat (1956) 33. + 2.000 m s.m. Sehnem,
Pter. Riogr. (1961) 13: RS.

Urostachys reflexum (Lam.) Hert. in Beiheft. Bot.
Centralbl. 2^a ser. 39 (1922) 249. Nessel, Lycop.
(1927) 392, tab. 10, fig. 2: SP, MG, PR, MT, AM,
PE; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 44, fig. 27: SP, RJ,
Itatiaia, Pedra do Eco a 2.400 m s.m., Km. 10,
Mont Serrat, MG, MT, PR, AM, PE. Angely, Fl Pter.
(1963) 4: PR, PE/MT.

Distr. Geogr.: AM, PA, PE (Boa Vista), MT (Cuiabá), MG (Ouro Preto, Boa Vista, S^a do Picú, S^a do Congo Soco, Cristina), RJ S^a dos Órgãos, Itatiaia, S^a da Estréla, Petrópolis, SP (Alto da Serra, Tieté, Rio Grande, Cantareira, S. José do Barreiro, Tatuí, Campos do Jordão), PR, RS. México, Guatemala, Nicarágua, Cuba, S. Vicente, Jamaica, S. Domingos, Haiti, Porto Rico, Guadalupe, Martinica, Costa Rica, Colômbia, Ecuador, Venezuela, Bolívia e Guianas.

28. **L. reflexum** Lam. var. **aquaticum** (Glaz.)

Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m.

Urostachys reflexus (Lam.) Hert. var. *aquaticus* (Glaz.) Hert, ex Nessel, Baerl. (1939) 117; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 47, fig. 30; SP, Campos do Itatiaia, MG.

Distr. Geogr.: MG (Caldas), RJ ? (Campos do Itatiaia), SP (Ilha de Santo Amaro, Campos do Itatiaia ?).

L. Saururus auct. plur. non Lam., Enc. Méth. 3 (1789) 653. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 39: MG, Itatiaia, Agulhas Negras; in Wettstein, Exped. (1908) 57: MG, Itatiaia.

Urostachys saururus (Lam.) Hert. apud Nessel, Lycop. (1927) 382 tab. 5: MG, S^a do Itatiaia (Cfr. **Lycopodium Luederwaldtii**).

Distr. Geogr.: MG (S^a de Ibitipoca, S^a do Papagaio, rio das Contas, Capivari, S^a. do Cipo, Caparaó), RJ (Itatiaia).

L. Selago L. Ule, Relat. (1895) 221: Itatiaia, nos campos. Cfr. **L. Christii** Alv. Silv.

29. **L. subulatum** Desv. in Poiret, Enc. Méth. Suppl. 3 (1813) 544. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 41: MG, SC. Brade in Rodriguesia (1937) 114: SP; Itat. (1956) 25, 33: + 2.000 m s.m.

Urostachys subulatus (Desv.) Hert. ex Nessel, Lycop. (1927) 420, tab. 33: SP; in Hoehne, Fl.Br. (1955) 88, fig. 72: SP, RJ,

Distr. Geogr.: MG (S^a do Papagaio), RJ (Itatiaia), SP (Campos do Jordão), SC (Blumenau).

30. **L. treitubense** Alv. Silv. in Bol. Comm. Geog. Geol. Minas Geraes 5 II (1898) 118, tab. 3: MG. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 38. Agulhas Negras 2.400 m m.s., M.G. Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m.; sub *L. Christii* var. *treitubense* Alv. Silv.

Urostachys treitubensis (Alv. Silv.) Hert. ex Nessel, Lycop. (1927) 380, tab. 3: MG, RJ, S^a do Itatiaia 2.100 m s.m. *U. Christii* (Alv. Silv.) Hert. var. *treitubensis* (Alv. Silv.) Nessel, Baerl. (1939) 46; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 27, fig. 9: MG, RJ. Itatiaia 2.100 m s.m., 2.300-2.500 m s.m.

Distr. Geogr.: MG (S^a de Treituba, Caldas), RJ, (Itatiaia).

31. **L. verticillatum** L. f., Suppl. (1781) 448. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 40: SC, SP; in Wetstein, Exped. (1908) 58: SP Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m. Sehnem, Pter. Riogr. (1961) 14: RS.

Urostachys verticillatus (L. f.) Hert. in Beiheft, Bot. Centralbl. 2^a ser. 39 (1922) 249. Nessel, Lycop. (1927) 398, tab. 17: SP, RJ, MG, PR, MT; in Hoehne, Fl. Br. (1955) 55, fig. 38: Ibid. Angely, Fl. Pter. (1963) 6: PR, MG/MT.

Distr. Geogr.: MT (Cuiabá), MG (S^a do Papagaio, Caldas), RJ (Itatiaia, S^a dos Órgãos), SP (S. José do Rio Pardo, Bocaina, Raiz da Serra, Barra Mansa), PR, (Ponta Grossa, Fortaleza), SC (Ilha de Sta. Catarina), RS. Neotr., Africa austr., Polinésia (ap. Sehnem).

SELAGINELLA Spring

1. **S. Breynii** Spring in Mart., Fl. Bras. (1840) 121. Dusén, Itat. (1905) 85: + 2.100 — 2.500 m m.s.; RJ. Guiana. Alston, Selagin. (1936) 314: PA, AM, Guiana Inglêsa.

Distr. Geogr.: AM (Manáus, Rio Negro, Rio Madeira, Cararaucu), PA, (Rio Aripecuru, Serra Juriti), RJ (Itatiaia), GB. Guiana Inglêsa.

2. **S. contigua** Baker in Journ. Bot. 22 (1884) 295. Rosenst., Pter. (1907) 166: SC. Hieronymus in Wettstein, Exped. (1908) 60: Itatiaia 1.400 — 2.000 m m.s., Alston, Selagin. (1936) 311: SP, RJ, Itatiaia 800 m m.s., SC.

Distr. Geogr.: RJ (Nova Friburgo, Itatiaia), GB (Tijuca), SP (Serra do Cubatão, Santos, Alto da Serra, Campo Grande, Itapecirica), SC (Joinville.)

3. **S. flexuosa** Spring in Flora 21 (1838) 197; in Mart., Fl. Bras. (1840) 122. Rosenst., Pter. (1907) 166: SC. Alston, Selagin. (1936) 316 MG, RJ, Itatiaia. GB, SP, PR, SC. Brade in Rodriguésia (1947) 30: ES, MG-SC. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 234: RJ. Angely, Fl. Pter. (1963) 6: PR.

Distr. Geogr.: MG (Ouro Preto, S. Sebastião, Bento Rodrigues, Rio Preto), ES (Jatiboca), RJ (Serra da Estréla, Itatiaia, Serra dos Órgãos), GB. (Corcovado, Serra Carioca, Tijuca), SP (Alto da Serra, Santos), PR (Vila Velha, Ipiranga), SC (Joinville).

4. **S. muscosa** Spring in Mart., Fl. Bras. (1840) 120. Alston, Selagin. (1936) 313: MG, SP, ES, RJ, Itatiaia, Mont Serrat, GB, PR, SC, RS, Argentina, Uruguai e Paraguai. Capurro, Catál. (1940) 192: Argentina. Brade in Rodriguésia (1940) 293: SC, ES-SC; (1947) 30: ES, MG-RS. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 234: RJ. Legrand y Lombardo, Pter. (1958) 12: Uruguai. Angely, Fl. Pter. (1963) PR.

Distr. Geogr.: CE (Serra de Baturité), MG (Ouro Fino, Ouro Preto), ES (Sta. Bárbara do Caparaó, Jatiboca) RJ (Macaé, Itatiaia, S^a dos Órgãos), GB (Corcovado), SP. (Jundiaí, Santos, Bocaina, Morro do Baú, Jaraguá, Morro das Pedras, Serra Cantareira), PR (Serra do Mar, Lucena), SC (Lages, Joinville), RS (Sta. Cruz, Apiaí) Paraguai, Argentina, Uruguaí.

5. **S. suavis** (Spring) Spring in Bull, Sc. Bruxelles 10 (1843) 229. Alston, Selagin. (1936) 317: RJ, Itatiaia, Mont Serrat, GB, SP, ES. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 234: RJ.

S. sulcata subsp. *suavis* Spring in Flora 21 (1838) 185; in Mart., Fl. Bras. (1840) 131.

Distr. Geogr.: MG (Mathias Ramos), ES (Serra do Caparaó), RJ (Itatiaia, Nova Friburgo), GB (Corcovado), SP. (Serra Cantareira, Morro Formoso.)

6. **S. tenuissima** Fée, Crypt. Vasc. Brés. 2 (1873) 98, tab. 108, fig. 1: RJ. Alston, Selagin (1936) 314: MG, RJ. Itatiaia (SP?), RS. Rosenst., Pter. (1907) 167: RS. Hieronymus in Wettstein, Exped. (1908) 60: RJ. Itatiaia 2.500 m s.m. Dutra, Pter. (1940) 67: RS.

Distr. Geogr.: MG (Serra do Papagaio, Ouro Preto, RJ) (Alto Macaé, Itatiaia), RS (Porto Alegre, Rio Pardo).

7. *S. tenuissima* Fée var. *major* Hieron. in Dusén (nomen nudum)? . Dusén, Itat. (1905) 109. ± 900 m m.s.

ISOETACEAE

ISOETES * L.

1. **I. Gardneriana** Kunze ex Mett., Fil. Lechl. Fasc. 11 (1859) 36 (nom. subnud.); Kunze ex A. Br. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. 4 (1862) 330. Kuhn in Mart., Fl. Bras. (1884) 647, tab. 79, fig. 1-4. Dusén Itat. (1905) 86: + 2.300 m s.m. - 2.600 m s.m., GO. Brade, Itat. (1956) 31, 33: + 2.000 m s.m.

Distr. Geogr.: GO (rio Douro), RJ (Itatiaia).

Obs: Brade, l. c., à pág. 31 cita *I. Gardneri* evidentemente por um lapso. A maioria dos autores siglam esta espécie **I. Gardneriana** Kunze ex A. Br. ou simplesmente A. Br. Pela bibliografia consultada, A. Br. não tem prioridade sobre Mettenius, mas a publicação deste último tem uma descrição tão deficiente que nenhum autor a considerou.

2. **I. Martii** A. Br. ex Kuhn in Mart., Fl. Bras. (1884) 646, tab. 78. Ule, Relat. (1895) 221: Itatiaia, nas lagoínhas. Pfeiffer, Isoet. (1922) 200: MG, RJ, Itatiaia. Brade, Itat. (1956) 31, 33: + 2.000 m s.m.

Distr. Geogr.: MG, RJ (Itatiaia)

- (*) OBS.: Deste gênero foram citadas algumas espécies sem determinação como por exemplo: Ule, Relat. (1895) 221 nsº. 98 e 227; Brade, Itat. (1956) 33. Na obra de Reed, Index Isoetales, entre as espécies citadas notamos **Isoetes organensis** Weber, Ber. Deutsc. Bot. Geselsch. 52 (1934) 122, descrita para a S^a dos Órgãos, Morro Açu e Isabeloca, q u e talvez pudessem a ela ser relacionadas.

OPHIOGLOSSACEAE

BOTRICHIUM Swartz

1. **B. australe** R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810) 164. Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m.; 48: 1.600 - 2.000 m s.m.; 71: RJ, Itatiaia, MG, Argentina, reg, austr.; map. 3: Austrália, Tasmânia, I. Lord Howe. Nova Zelândia, Chile, Argentina; ib. (1960) 209: MG.

Distr. Geogr.: MC (Caparaó), RJ (Itatiaia), Hemisfério austral.

2. **B. decompositum** Martens et Galleotti in Mém. Ac. Bruxelles 15 (1842) 15, tab. 1. Dusén, Itat. (1905) 83. + 2.300 m s.m., Serra Miraflôres. Brade in Rodriégua (1942) 38: RJ, Itatiaia.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia); México, Costa Rica.

MARATTIACEAE

MARATTIA Swartz

1. **M. Kaulfussii** J. Smith in Hooker, Gen. Fil. (1839) tab. 26. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 153. Rosenst, Pter. (1907) 162: RS, SC, PR, SP. Brade in Rodriégua (1942) 34: 2.000 m s.m., Macieiras; (1947) 31: ES, Amer. trop., RS. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 226: RJ. Angely, Fl. Pter. (1963) 9: PR.

Distr. Geogr.: ES (rio São Sebastião, Sta. Maria), RJ. (Angra dos Reis, Teresópolis, S^a dos Órgãos, S^a da Estréla, Itatiaia), SP (Alto da Serra), PR (Campo da Lança), SC (Lajes, Morro Járaguá) RS. (Santa Cruz).

OSMUNDACEAE

OSMUNDA L.

1. O. **Regalis** L. var. **palustris** (Schrad.) C. Chr., Ind. Fil. (1906) 475. *O. palustris* Schrader, Goett. Gelehrt. Anzeig. (1824) 866.

Obs.: Os autores que citaram êste taxon para o Brasil, o fizeram de diversas formas. Umas vêzes como subespécie, outras como variedade e ainda outras como sinônimos: Sturm in Fl. Bras. (1859) 165 tab. 12. Christ in Wettstein (1908) 55: SP, Perú. Brade in Rodriguésia (1942) 39: RJ, Itatiaia 800-900 m. s.m.; (1947) 31: MG, ES-SC, Paraguai e Argentina. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 226: RJ Legrand y Lombardo, Pter. (1958) 14, tab 5: Uruguai. Angely, Fl. Peter. (1963) 9-10: PR.

Distr. Geogr.: MG, ES (Alto Limoeiro), RJ. (S^a dos Órgãos, Itatiaia) SP (Campo Grande, Lapa, Rio Grande), PR, SC (Blumenau, Lajes, S. Bento), RS. Paraguai, Uruguaí, Argentina, Perú.

SCHIZAEACEAE

ANEMIA Swartz

1. A. **flexuosa** (Sav.) Sw. var. **villosa** (H. B. ex Willd.) Pr. Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m.

A. villosa H. B. ex Willd., Sp. Pl. 5 (1810) 92. Sturm in Fl. Bras. (1859) 205. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 54, tab. 5, fig. 3: MG, Itatiaia 2.000 - 2.500 m s.m.

Distr. Geogr.: MG (S. Sacramento, rio Grande), RJ (S^a da Estréla, Itatiaia); Venezuela.

2. **A. Gardneri** Hooker, Icon. Pl. 2 (1837) tab. 190. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 37: RJ, S^a do Itatiaia; MG.

Distr. Geogr.: MG (S^a do Caraça), RJ (Itatiaia).

LYGODIUM Swartz

1. **L. volubile** (H. B. ex Willd.) Sw. in Schrader, Journ. Bot. (1801) 304. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 177. tab. 14, fig. 17 - 18. Sampaio, Eufil. (1930) 46: PA. Brade in Rodriguésia (1940) 314 in Massart, fig. 231: RJ, (1942) 34: RJ, Itatiaia; in Herb. (1946) 12: ES. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 234: RJ. Brade, Itat. (1956) 20.

Hidroglossum volubile H. B. ex Willd., Sp. Pl. 5 (1810) 78.

Distr. Geogr.: PA, PE, ES (Santa Teresa), RJ (S^a dos Órgãos, Itatiaia, Cachoeiras), SP (Limeira, Rio Grande), SC (Blumenau, Indaial), RS (Porto Alegre); Guiana Inglêsa e Surinam.

GLEICHENIACEAE

GLEICHENIA Smith

1. **G. angusta** (Kl. ex Sturm) Rosenst.

Brade in Rodriguésia (1937) 116: SP; (1940) 314 in Massart, fig. 332: RJ, Itatiaia 1950 m s.m.; fig. 339: 1,250 m s.m.; (1942) 37: RJ, Itatiaia; Itat. (1956) 26, 33: + 2.000 m s.m.; 71: endêmica?

Mertensia angusta Klotzsch ex Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 225.

Gleichenia revoluta H. B. K. var. *angusta* (Kl. ex Sturm) Christ in Wettstein, Exped. (1908) 48: MG, Itatiaia.

Distr. Geogr.: MG (S^a do Picú, S^a do Papagaio, S^a Ouro Preto), RJ (Itatiaia), SP (Campos do Jordão).

2. **G. flexuosa** (Schrad.) Mett. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1 (1863) 50. Rosenst., Pter. (1907) 62: SC, PR, SP. Sampaio, Eufil. (1930) 45: AM. Brade in Rodriguésia (1940) 314 in Massart, fig. 416. MG. Dutra, Pter. (1940) 60: RS. Brade in Rodriguésia (1942) 36: RJ, Itatiaia. Angely, Fl. Pter. (1963) 12: PR.

Mertensia flexuosa Schrad. in Goett. gelehrt. Anzeit. (1824) 863. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 230.

Distr. Geogr.: AM (Milho), BA (Belmonte), ES, MG (Ouro Branco), RJ, (Itatiaia), SP (Campinas, Rio Grande), PR, (Cupim, Itoupava), SC (Joinville), RS (S. Leopoldo).

3. **G. linearis** (Burmann) C.B. Clarke in Trans. Linn. Soc. ser. 2 Bot. 1 (1880) 428. Sampaio, Eufil. (1930) 45: Roraima. Brade in Rodriguésia (1940) 293: CE, N. Zelândia. Dutra, Pter. (1940) 60 RS. Capurro, Catál. (1940) 175: Argentina. Brade in Rodriguésia (1942) 39; RJ, Itatiaia, Angely, Fl. Pter. (1963) 12: PR, reg. trop. e subtrop., N. Zelândia.

Polypodium lineare Burmann, Fl. Ind. (1768) 235, tab. 67, fig. 2

Distr. Geogr.: Roraima, CE (S^a de Baturité), RJ (Itatiaia), PR, RS (S. Leopoldo, Río Pardo). Argentina. Nova Zelândia.

4. **G. longipes** (Fée) Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 35: MG. Dusén, Itat. (1905) 83: + 2.300 m s.m., MC. Angely, Fl. Pter. (1963) 12: PR, MG, SP, SC.

Mertensia longipes Fée, Crypt. Vasc. Brés. 2 (1873) 87, tab. 105, fig. 2.

Distr. Geogr.: MG (S^a de Camarinhas, Ouro Preto, S^a do Pica), RJ (Itatiaia), SP, PR, SC, RS.

5. **G. nervosa** (Kaulf.) Sprengel, Syst. Veg. 4 (1827) 25. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 35: SP, RJ, MG, C, RS. Rosenst. Pter. (1904) 211; RS, SC. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 47: SP, MG, Itatiaia. Brade in Rodriguésia (1937) 314 in Massart, fig. 332: Itatiaia 1.950 m s.m. Dutra. Pter. (1940) 60: RS. Capurro, Catál. (1940) 175: Argentina. Brade in Rodriguésia (1942) 36: RJ, Itatiaia, Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 223: RJ. Brade, Itat. (1956) 33: + 2.000 m s.m. Angelý, Fl. Pter. (1963) 12: PR, Paraguay e Argentina.

Mertensia nervosa Kaulf., Enum. Fil. (1824) 37. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 236.

Distr. Geogr.: MG (S^a do Picú, Rio das Pedras), RJ (Teresópolis, Itatiaia, S^a dos Órgãos), SP (S^a da Mantiqueira, Campo Grande, Barra Mansa, Campos do Jordão), SC (Joinville, S^a Três Barras, Itajaí, RS (Santa Cruz, Farromeco, Bom Jesus); Paraguai e Argentina.

6. **G. revoluta** H. B. K., Nov. Gen. Sp. Pl. 1 (1815) 29. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 34: MG, Itatiaia 1.700 — 2.200 m s.m.

Obs.: Segundo Brade in Rodriguésia (1942), eram conhecidas para o Itatiaia 9 espécies dêste gênero, mas pela literatura consultada encontramos apenas 6.

HYMENOPHYLLACEAE

HYMENOPHYLLUM Smith

1. **H. brasiliannum** (Fée) Rosenst. in Hedwigia 46 (1907) 73. Dutra, Pter. (1940) 24: RS. Brade, Itat. (1956)

31: + 2.000 m s.m. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 303: RS, RJ.

H. Crispum R. B. K. var. *brasiliandum* Fée, Crypt. Vasc. Brés. 1 (1869) 195, tab. 71, fig. 2.

Distr. Geogr.. RJ (S[?] dos Órgãos, Itatiaia), RS (Soledade, Taquara, Bom Jesus).

2. ***H. caudilatum*** Mart., Icon. Select. Crypt. Bras. (1834) 102, tab. 67. Sturn in Mart., Fl. Bras. (1859) 286. Rosenst., Pter. (1904) 215. SC Dusén, Itat (1905): 105: + 1.000 m s.m., AM, MG, RJ, SP, Chile, J. Fernandez, Patagonia occid. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 15: SP, Perú. Sampaio, Hymenoph. (1923) 3: RJ. Itatiaia, PR, MG, GB, SP; Eufilic (1930) 19: PA, PR. Brade in Rodriguesia (1937) 113: SP. Pickel, Catál. (1938) 65: GB. Dutra, Pter. (1940) 25: RS. Capurro Catál. (1940) 73: Patagônia, Brade in Rodriguesia (1942) 35: RJ, Itatiaia. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 223: RJ. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 303: RS, SC, Patagônia, Perú, J. Fernandez. Angely, Fl. Pter. (1963) 13: PR.

Distr. Geogr.: AM (Rio Japurá, Cachoeira S. Gabriel) PA (Rio Cuminá), MG (Ouro Preto,) RJ (Teresópolis, S[?] da Estréla, Nova Friburgo, Itatiaia, S[?] dos Órgãos), GB (Corcovado, Tijuca), SP (Alto da Serra, Barra Mansa, Rio Grande, Raiz da Serra, Campos do Jordão, Santos), PR (Ipiranga), SC (Itajaí, Lajes, Joinville, Três Barras), RS (Gravataí, S. Leopoldo, Venâncio Alves, Aparados da Serra, S. Francisco de Paula); Argentina, Perú, Chile, J. Fernandez.

3. ***H. ciliatum*** Swartz in Schrader, Journ. Bot. (1801) 100. Sturn in Mart., Fl. Bras. (1859) 292, tab. 19, fig. 4. Rosenst., Pter. (1904) 215. SC. Christ in

Wettstein, Exped. (1908) 16: SP, MG, Itatiaia. Sampaio, Hymenoph. (1923) 4: RJ, PR, MG, AM, SP; Eufil. (1930) 20: PA, MG, PR. Brade in Rodriguésia (1937) 113: SP; (1940) 314 in Massart, fig. 349: RJ. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 303: RS, Amer. trop., África trop. austr., N. Zelândia. Angely, Fl. Pter. (1963) 13: PR.

Distr. Geogr.: AM (Rio Japurá, Barra do Rio Negro, Alto Amazonas), PA (Rio Acará), MG (S^a do Ouro Preto, Itacolomi), RJ (S^a dos Órgãos, Macacú, Itatiaia), SP Bertioga, Braço Grande, Rio Grande, (Campos do Jordão, Santos), PR (Vila Velha, Ipiranga), SC (Joinville), RS) S. Francisco de Paula). Surinam, Venezuela, Jamaica, N. Zelândia, África trop. austr.

4. **H. ciliatum** Sw. var. **elatum** (Christ) C. Chr., Ind. Fil. (1906)

H. elatum Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 13: SC. Dusén, Itat. (1905) 106: + 1.000 m s.m., SC. Sampaio, Hymenoph. (1923) 4: MG, PR, RJ, Itatiaia.

Dist. Geogr.: MG, RJ (Itatiaia), PR (Ipiranga), SC (Sto. Antonio).

5. **H. fucoides** (Sw.) Sw. in Schrader, Journ. Bot. (1801) 99. Stur in Mart.; Fl. Bras. (1859) 284. Dusén, Itat. (1905) 77: + 2.200 m. s.m., RJ, Perú, Venezuela, Jamaica. Antilhas, México. Rosenst, Pter. (1904) 215: SC. Luetzelburg, Estudos 3 (1923) 239: Itatiaia. Sampaio, Hymenoph. (1923) 4: RJ, Itatiaia, AM. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 16: MG, Itatiaia. Sampaio, Eufil. (1930) 20: Roraima, RJ Brade in Rodriguésia (1942) 37: RJ, Itatiata. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Brade, Itat. (1956) 31: + 2.000 m m.s. 52, 70: Amer. trop., Itatiaia, Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 305: RS, Amer. trop., Samoa.

Trichomanes fucooides Swartz, Prodr. (1788) 136.

Distr. Geogr.: Roraima, RJ (S^a. dos Órgãos, Itatiaia, Teresópolis), SC (Joinville), RS (Aparados da Serra, S. Francisco de Paula); Venezuela, Perú, México, Antilhas, Jamaica, Costa Rica, Samoa.

6. *H. interruptum* Kze. in Linnaea 9 (1834) 107. Dusén, Itat. (1905) 77. + 2.200 m s.m., Amer. trop. Angely, Fl. Pter. (1963) 14; PR, Perú, Amer. Central, México.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia), PR; México, America Central, Perú.

7. *H. microcarpum* Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 4 (1827) 333. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 15: SP. Sampaio, Hymenoph. (1923) 5: RJ Itatiaia, Mont Serrat, PR, MG; Eufil. (1930) 20: Roraima. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Angely, Fl. Pter. (1963) 14: PR. *H. organense* Hook., Sp. Fil. 1 (1844) 90, tab. 323. Sturm in Mart. Fl. Bras. (1859) 293, tab. 19, fig. 8. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 15: SP. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 307: SC.

H. microcarpum Desv. var. *organense* Brade in Rodriguésia (1942) 35: RJ, Itatiaia.

Distr. Geogr.: Roraima, MG (Itacolomi), RJ (Itatiaia, Macaé, S^a da Estréla), SP (Alto da Serra, Rio Grande, Braço Grande), PR (Ipiranga), SC (Itajaí); Venezuela.

8. *H. peltatum* (Poir.) Desv. var. *megachilum* (Presl) Brade, Itat. (1960) 210: ES, México, Europa, I. Faroe.

H. megachilum Presl, Die Gefaessb. in Stipe Farnn () 29, tab 5, fig. 18; Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 285. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia, 900 m s.m. (Rio Bonito) até 2.400 m s.m.; Catarao (1942) 91: MG

Distr. Geogr.: MG (Caparaó), RJ (Itatiaia, S^a dos Órgãos); México, Europa, I. Faeroe.

9. **H. plumosum** Kalf., Enum. Fil. (1824) 267. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 299. Brade in Rodriguésia (1937) 113: SP. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Brade, Itat. (1956) 52.

Distr. Geogr.: MG (S^a do Caraça), RJ (S^a da Estréla, Itatiaia, S^a dos Órgãos), SP (Campos do Jordão); Costa Rica, Perú orient.

10. **H. polyanthos** (Sw.) Sw. in Schrader, Journ. Bot. (1801) 102. Sturm in Mart.. Fl. Bras. (1859) 288, tab. 19, fig. 3. Rosenst, Pter. (1904) 215: SC. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 15. SP. Sampaio, Hymenoph, (1923) 5: MT, MG, PA, RJ, PR, SP, SC; Eufil. (1930) 20: AM; PA, SC, MT, MG, PR, RJ, SP, Colômbia. Dutra, Pter. (1940) 25: RS. Hoehne in Rondon (1951) 110: MT. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Brade, Itat. (1956) 31: + 2.000 m s.m. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 307: RS, SC. Angely, Fl. Pter. (1963) 14: PR

Trichomanes polyanthos Swartz, Prodr. (1788) 137.

Distr. Geogr.: AM (Uaupés), PA (Rio Acará, S. Joaquim), MT (Juruena), MG (S^a de Ouro Preto, Caldas), RJ (Itatiaia, S^a da Estréla, S^a dos Órgãos, Teresópolis), SP (Rio Grande, Braço Grande, Campo Grande, Alto da Serra, Apiaí, Santos), PR (Curitiba, Vila Velha), SC (Joinville) Itajaí, Blumenau, Lajes), RS (S. Leopoldo, Bom Jesus, Sta. Cruz, Montenegro, Aparados da Serra, S. Francisco de Paula, Vacaria). Samoa, Japão, África trop. ocid., Madagascar, Jamaica, Guianas, Colômbia, Venezuela.

11. **H. polyantos** Sw. var. **Sturmii** van den Bosch in Ned. Kr. Arch. 5 (1863) 152. Rizzini, in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Brade, Itat. (1956) 31: + 2.000 m s.m. Angely, Fl. Pter. (1963) 14: PR.

Distr. Geogr.: RJ (S^a dos Órgãos, Itatiaia), SP (Campos do Jordão), PR.

Obs.: Brade in Rodriguésia (1937) 113: SP, cita-a como espécie.

12. **H. rufum** Fée, Crypt. Vasc. Brés. 1 (1869) 198, - tab. 70, fig. 4: RJ. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 14: RJ, SC. Sampaio, Hymenoph. (1923) 6: SP, RJ, MG. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Brade, Itat. (1956) 31: + 2.000 m s.m. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 308: SC, RS, Costa Rica. Angely, Fl. Pter. (1963) 15: PR.

Distr. Geogr.: MG (Caldas), RJ (Itatiaia, Teresópolis, S^a dos Órgãos), SP (Bocaina), PR, SC (Bom Retiro), RS (S. Francisco de Paula, Aparados da Serra); Costa Rica.

13. **H. tunbrigense** (L.) Smith in Mém. Acad. Turin 5 (1793) 418. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1905) 14: RJ, Itatiaia, Agulhas Negras 2.200 m s.m. Dusén, Itat. (1905) 77: + 2.200 m s.m., Costa Rica, Bolívia, Chile, J. Fernandez, Patagonia occid., Fuegia, Europa, etc. Capurro, Catál. (1940) 76: Argentina. Sampaio, Hymenoph. (1923) 7: RJ, Itatiaia.

Trichomanes tunbrigense L., SP. Pl. 2 (1753) 1098.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia); Costa Rica, Bolívia, Chile, Fuegia, Europa, J. Fernandez, Patagonia occid.

Obs.: Dusén, l. c., cita *H. tunbrigense* Swartz.

14. **H. undulatum** Swartz

Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 15: MG.
Dusén, Itat. (1905) 77: + 2.200 m s.m.; Antilhas até
Perú; Bras. austr.

Distr. Geogr.: MG. (Morro de S. Sebastião), RJ (Itatiaia);
Antilhas, Perú.

TRICHOMANES L.

1. **T. elegans** L. C. Rich. in Nov. Acta Soc. Hist. Nat. Paris 1 (1792) 114. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 31: SP. Sampaio, Hymenoph. (1923) 8: MG, SC, AM, RJ; Eufil. (1930) 15: AM, MG, SP, GB, RJ. Brade in Rodriguésia (1942) 35: RJ, Itatiaia; (1947) 34: ES; Itat. (1956) 44. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 310: SC. Angely, Fl. Pter. (1953) 15: PR.

Distr. Geogr.: AM (Rio Japurá, rio Içá, rio Paperi), MG (Teixeira Soares, Serra do Caraça), ES (Alto Limoeiro), RJ (Teresópolis, Itatiaia), GB, SP (Braço Grande, Rio Grande), PR, SC (Biguaçú, Blumenau, Itajaí); Guianas, Amer. Central, I.S. Vicente, Guadalupe, Trinidad.

2. **T. firmulum** Plesl, Hymen. (1843) 16, 46. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 268. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia, 2.000 m s.m. Macieiras. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 310: RS.

Distr. Geogr.: RJ (S^a. da Estréla, Itatiaia), RS (S. Leopoldo).

Obs.: Segundo Féé (1869) e Christensem (1906) esta espécie é sinônimo de **T. rigidum** Sw.

3. **T. lucens** Swartz, Prodr. (1788) 136. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 15: SP, SC. Brade, itat. (1956) 25.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia), SP (S^a. Bocaina), SC (Blumenau).

4. **T. mandiocanum** Raddi in Opusc. Sci. Bologna 3 (1819) 296. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 267, tab. 18, fig. 12. Sampaio, Eufil. (1930) 19: RJ, SP, Venezuela. Brade in Rodriguésia (1942) 35: RJ. Itatiaia. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Angely, Fl. Pter. (1963) 16: PR.

Distr. Geogr.: RJ (S^a. da Estréla, Itatiaia, S^a. dos Órgãos), SP, PR; Venezuela.

5. **T. pinnatifidum** van den Bosch in Ned. Kr. Arch. 5 (1861) 202. Dusén, Itat. (1905) 105: + 900 m s.m. Sampaio, Hymenoph. (1923) 10: RJ, Itatiaia.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia), SP (Rio Grande), SC (Blumenau).

6. **T. polypodioides** L. Sp. Pl. 2 (1753) 1098. Sampaio, Hymenoph. (1923) 11: MT, MG, RJ, SC, PR, SP; Eufil. (1930) 17: AM-RS. Dutra, Pter. (1940) 26: RS. Capurro, Catál (1940) 72: Argentina. Brade in Rodriguésia (1942) 35: RJ, Itatiaia. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 224: RJ. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 313: SC, RS. Legrand y Lombardo (1958) 19: Uruguai.

Distr. geogr.: AM, RJ (Itatiaia, S^a. dos Órgãos), MG (Teixeira Soares), GB (Corcovado, Tijuca), SP (Santos), PR (Curitiba, Ipiranga), SC (Itajaí, Blumenau, Ilha de Sta. Catarina), RS (Bom Jesus, Sta. Cruz); Amer. Central, Guiana Francesa, Argentina, Uruguay.

7. **T. pyxidiferum** L. Var.

Brade, Itat. (1956) 31: + 2.000 m s.m.

Obs - Brade menciona uma variedade sem indicar a qual se refere.

Rosenstock in Fedde, Repert. 20 (1924) 89 cita a var. **organense** para a S^a. dos Órgãos e a var. **gracile** para o Corcovado (GB.)

8. **T. radicans** Swartz in Schrader, Journ. Bot. (1801) 97. Rosenst., Pter. (1904) 216: SC. Sampaio, Hymenoph. (1923) 11: RJ, SC, MG, PR, SP; Eufil. (1930) 18: ibid., Guianas, Guatemala, Costa Rica, Equador, Colômbia. Brade in Rodriguésia (1942) 35: RJ, Itatiaia. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 225: RJ. Angely, Fl. Pter. (1963) 16: PR.

Distr. Geogr.: MG (Teixeira Soares), RJ (Itatiaia, Canta-galo, S^a. dos Órgãos, GB, SP (Santos), PR (Carambeí), SC (Blumenau). Cosmopolita.

9. **T. rigidum** Swartz, Prodr. (1788) 137. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 267. Rosenst., Pter. (1904) 216: SC. Dusén, Itat. (1905) 105: \pm 1.000 m s.m., MG, Bolívia, Guiana Ingl., Jamaica, Guadalupe, África e Ásia trop. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 13: SP. Sampaio, Hymenoph. (1923) 12: RJ, PR, MG, Itatiaia, SP; Eufil. (1930) 18: Amer. Central, até SC. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 315: SC, RS.

Distr. Geogr.: MG, (Ouro Preto), RJ (Nova Friburgo, Itatiaia), SP (Santos, S^a. S. João, Braço Grande, Rio Grande), PR (Ipiranga, Campos Gerais), SC Biguaçú, Palhoça, Tijucas). Cosmopolita.

10. **T. tenerum** Sprengel, Syst. Veg. 4 (1827) 129. Sturm in Mart., Fl. Bras. (1859) 273, tab. 18, fig. 7 - 8. Rosenstock, Pter. (1904) 216: SC. Dusén, Itat. (1905) 105: \pm 1.000 m s.m.; RJ, MG, Bolívia. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 14: SP. Sampaio, Hymenoph. (1923) 13: MG, SC, PR, RJ, Itatiaia 900 m s.m.; Eufil. (1930) MG, RJ, Bolívia. Brade in Rodriguésia (1942) 35: RJ, Itatiaia. Kizzini in Arq. J. Bot. (1954)

225: RJ. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 315: RS. Le-grand y Lombardo, Pter. (1958) 17; Uruguai. Angely, Fl. Pter. (1963) 16: PR, Amer. trop.

Distr. Geogr.: MG (Ouro Preto, Caldas), RJ (Teresópolis, Itatiaia, S^a. da Estréla, S^a. dos Órgãos), SP (Rio Grande, Faxina, Apiaí, Alto da Serra), PR (Vila Velha, Curitiba), SC (Lages, Blumenau), RS (Gravataí, Bom Jesus, S. Francisco de Paula, Rio Pardo, Sta. Cruz, Cachoeira, S Leopoldo, Aparados da Serra, Vacaria); Bolívia, Uruguai.

PLAGIogyriaceae

PLAGIogyria (Kunze) Mett.

1. **P. Fialhoi** (Fée et Glaz. ex Fée) Copel. in Univ. Calif. Publ. Bot. 19 (1941) 297. Brade in Rodriguésia (1937) 114: SP; (1942) 37, tab. 1: RJ, Itatiaia. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 231: RJ. Brade, Itat. (1956) 27, 28, 31: + 2.000 m s.m., 52: Bocaina, Itatiaia, S^a. dos Órgãos, Caparaó, SC; 70: ib.; Itat. (1960) 24: montanhas do Brasil Central e SC.

Lomaria Fialhoi Fée et Glaz. ex Fée, Crypt. Vasc. Brés. 1 (1869) 239, tab. 7, fig. 2: RJ.

Distr. Geogr.: MG (Caparaó), RJ (S^a. dos Órgãos, Itatiaia), SP (Campos do Jordão, Bocaina), SC.

Dicksoniaceae

CULCITA Presl

1. **C. Coniifolia** (Hook.) Maxon in Journ. Wash. Acad. Sci. 12 (1922) 454. Brade in Rodriguésia (1942) 37: RJ, Itatiaia; Itat. (1956) 31: + 2 000 m s.m.; 57, 70: Ecuador - México, Jamaica; Itat. (1960) 215: nos cumes.

Dicksonia coniifolia Hooker, Sp. Fil. 1 (1844) 70, tab. 24 A. Baker in Mart., Fl. Bras. (1870) 340. Dusén, Itat. (1905) 77; + 2 200 m m.s., Retiro do Ramos; Bras. austr., Colômbia, Antilhas.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia). México, Antilhas, Jamaica, Venezuela, Colômbia, Ecuador, Perú.

DICKSONIA L'Hérit.

1. D. **Sellowiana** (Presl) Hook., Sp. Fil. 1 (1844) 67, tab. 22 B. Baker in Mart., Fl. Bras. (1870) 340, tab. 20, fig. 20, tab. 40, fig. 5, tab. 70, fig. 1. Rosenst., Pter., (1904) 214: RS. Dusén, Itat: (1905) 77: + 2.050 m s.m., Retiro do Ramos, Macieira do Couto; + 2.100 m s.m., Macieira do Meio; Bras. austr., RJ, MG, SC, Perú Oriental, Ecuador, Costa Rica, Guatemala. Christ in Westtstein, Exped. (1908) 19: SP. Brade in Rodriguésia (1937) 113: SP. Dutra, Pter. (1940) 28: RS. Capurro, Catál. (1940) 77: Argentina. Brade in Rodriguésia (1942) 38: RJ, Itatiaia; (1949) 138: MG; (1951) 58: SP, 65. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 223: RJ. Brade, Itat. (1956) 24: + 1.000 m s.m.; 47. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 324: RS, Ecuador, Legrand y Lombardo, Pter. (1958) 19: Uruguay. Angely, Fl. Pter. (1963) 19: PR.

Balantium Sellowianum Presl, Tent. Pter. (1836) 134 nomen solum.

Distr. Geogr.: MG (Caldas, Passa Quatro), RJ (S^a. dos Órgãos, Itatiaia), SP (Apiaí, Faxina, Rio Grande, Piilar, Campos do Jordão, Bocaina), SC, RS (Bom Jesus, Gravataí, P. Alegre, St^a Maria, S. Leopoldo, St^a. Cruz, Montenegro, Gramado, S. Francisco de Paula). Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú, Uruguai e Argentina.

Obs.: A sigla correta deve ser D. **Sellowiana** (Presl ex Hook.) Hook.

CYATHEACEAE

ALSOPHILA R. BR.

1. **A. armata** (Swartz) Presl, Tent. Pter. (1836) 62. Baker in Mart., Fl. Bras. (1870) 331, tab. 20, fig. 12 – 13 e tab. 69, fig. 1. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 18: SP. Sampaio in Arch. Mus. Nac. 25 (1925) 67, tab. 17, 18 e 19, fig. I 1: Amer. trop. (México, Antilhas) e Amer. meridion. (Perú, Bolívia). Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia; (1946) 127: MG; Itat. (1956) tab. 14: 900 m s.m. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 317: RJ, SP, SC, RS. Angely, Fl. Pter. (1963) 17: PR.

Polypodium armatum Swartz, Prodr. (1788) 134.

Distr. Geogr.: AM, CE (Serra de Baturité), MG (S. Sebastião do Paraíso), RJ (Itatiaia), GB (Tijuca), SP (Ilha Sto. Amaro), PR, SC (Ilha Sta. Catarina, Brusque), RS. Bolívia, Perú, Antilhas e México.

2. **A. corcovadensis** (Raddi) C Chr., Ind. Fil. (1906) 41. Sampaio in Arch. Mus. Nac. 25 (1925) 46, tab. 2 e 3 fig. 1: MG, RJ, SP, SC, RS. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 318: MG, RJ, SP, SC, RS. Angely, Fl. Pter. (1963) 17: PR.

Polypodium corcovadense Raddi, Opusc. Sci. Bologna 3 (1819) 288.

P. taenitis Roth, Nov. Sp. Pl. (1821) 394.

Alsophila taenitis Kunze in Linnaea 9 (1834) 90. Baker in Mart., Fl. Bras. (1870) 319, tab. 40, fig. 4 b e tab. 67, fig. 3. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 16: SP.

Distr. Geogr.: MG, RJ (Itatiaia), GB (Tijuca), SP (Barra Mansa, Xiririca, Rio Grande, Santos), PR, SC (Ilha de S^a. Catarina, Araranguá), RS.

3. **A. decipiens** Fée, Crypt. Vasc. Brés. 2 (1873) 81, tab. 103, fig. 1: Itatiaia. Sampaio in Arch. Mus. Nac. 25 (1925) 47, tab. 3, fig. 2. Brade, Itat. (1956) 55: (? - A. elegans Mart.). Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 318: RJ, Serra do Itatiaia, SC.

Distr. Geogr.: RJ (Itatiaia), SC Biguaçú, Lages), RS.

4. **A. dichromatolepis** Fée, Crypt. Vasc. Brés. 1 (1869) 164, tab. 57, fig. 2: RJ; ibid. 2 (1873) 80: RJ, Itatiaia. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 32: RJ. Sampaio in Arch. Mus. Nac. 25 (1925) 57, tab. 3, fig. 6: RJ, SP. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 222: RJ.

Distr. Geogr.: MG (Córrego dos Macacos), RJ (Serra dos Órgãos, Itatiaia), SP.

5. **A. elegans** Mart., Icon. Crypt. Bras. (1834) 63, tab. 38. Baker in Mart., Fl. Bras. (1870) 319. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 32: MG. Dusén, Itat. (1905) 78: + 2.100 m m.s., Retiro do Ramos, Macieira do Couto, Brasil austr. - orient., MG, SP (sub *A. elegans* R. Br.) Sampaio in Arch. Musc. Nac. 25 (1925) 49: MG, RJ (Serra do Itatiaia), SP. Brade in Rodriguésia (1937) 113: SP; (1942) 36: RJ, Itatiaia; (1949) 137: MG; (1951) 65: SP; in Filices (1951) 35: MG, SP, RJ, Itatiaia, Macieiras 1.800 m s.m.; Itat. (1946) 24: a 2.300 m s.m., 25, 31: + 2.100 ms.m., 47. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 222: RJ.

Distr. Geogr.: MG (Passa Quatro, Ouro Preto, Serra de Saramenha), RJ (Itatiaia, Serra dos Órgãos), SP (Campos do Jordão, Bocaina, Barianal, Mandaqui).

6. **A. elegans** Mart. var: **crenata** Bak. in Mart., Fl. Bras. (1870) 320, tab. 53. Brade in Filices (1951) 35: RJ, Serra do Itatiaia, Pinheiral, 2.100 m s.m.

Distr. Geogr.: MG (Caldas), RJ (Itatiaia).

7. **A. Feeana** C. Chr., Ird. Fil. (1906) 42. Sampaio in Arch. Mus. Nac. 25 (1925) 48, tab. 3, fig. 3: RJ, PR, SC, Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 223: RJ. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 319: RS, RJ, PR, SC. Angely, Fl. Pter. (1963) 17: PR.

Trichopteris elegans Fée, Crypt Vas. Brés. 2 (1873) 83 non Presl.

A. Glaziovii Baker in Mart. Fl. Bras. (1870) 592 non Fée. Christ in Wettstein, Exp. (1908) 17, tab. 1, fig. 2 - 3 e tab. 8, fig. 7 - 9: MG, Itatiaia 2.000 m m.s.

Distr. Geogr.: MG, RJ (Itatiaia, Serra dos Órgãos), SP (Faxina, Apiaí), PR, SC (Ilha de St^a Catarina), RS.

8. **A paleolata** Mart, Icon. Select. Crypt. Bras. (1834) 68, tab. 43. Baker in Mart, Fl. Bras. (1870) 329. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. (1900) 32; endêmica do Sul do Brasil. Rosenst., Pter. (1904) 214: SC. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 18: GO, MG. Sampaio in Arch. Mus. Nac 25 (1925) 64, tab. 9, fig. 7 e tab. 15: BA, GO, MG, SP, RJ, MT, SC. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia. Rizzini in Arq. J. Bot (1954) 223: RJ. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 319: BA, GO, MG, RJ, SP, SC, RS.

A. Gardneri Hooker, Sp. Fil. 1 (1844) 40. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia.

Distr. Geogr.: BA, GO, MT, MG (S. Sebastião do Paraíso, Serra de Saramenha, Serra de Ouro Preto), RJ (Itatiaia, Serra dos Órgãos), SP (Bela Vista), PR, SC (Ilha de Santa Catarina, Brusque), RS.

9. **A. Portoana** Brade in Arch. Inst. Biol. Veg. 1 III (1935) 223, tab. 1: Serra do Itatiaia, 3 Picos, 1.200 m s.m.; in Rodriguésia (1942) 34, 39: endêmica: Itat. (1956) 55 (*).

Distr. Geogr.: RJ, endêmica do Itatiaia.

(*) Obs.: Brade, 1. c. à pág. 45, cita *Alsophila Campos - Portoi* que julgamos tratar-se da *A. Portoana*, ou talvez referir-se a *Asplenium Campos - Portoi*.

CYATHEA Smith

1. **C. Gardneri** Hook., Sp. Fil. 1 (1844) 21 tab. 10 A. Baker in Fl. Bras. (1870) 307 tab. 20 fig. 1—2 Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. 2 (1900) 30: MG; in Wettstein, Exped. (1908) 19: MG, SP. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ (Itatiaia); (1949) 135: MG. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 323: SC. Angely, Fl. Pter. (1963) 19: PR.

Distr. Geogr.: GO, MG (Caldas, Barbacena, Ouro Preto, Mercês, Morro Velho, Morro Vermelho, São João del Rei, Morro de S. Ana, Serra do Saramenha, Passa Quatro), RJ (Itatiaia), GB (Tijuca), SP (Franca), PR, SC (Biguaçu).

2. **C. schanschin** Mart., Icon. Select. Crypt. (1834) 77 tab. 29 fig. 3 - 4, tab. 54. Baker in Fl. Bras. (1870) 309 tab. 40 fig. 13, tab. 67 fig. 1. Christ in Schwacke, Pl. Nov. Min. 2 (1900) 31: MG, SC, MT. Dusén, Itat. (1905) 106: + 800 - 1.000 m m.s.; MT, SC, RJ, MG, BA, Amér. Central, Antilhas, Jamaica. Christ in Wettstein, Exped. (1908) 19: SP, MG, GO. Dutra, Pter. (1940) 27: RS. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ (Itatiaia). Rizzini in Arq. Jard. Bot. (1953 - 54) 223: RJ (Serra dos Órgãos). Brade, Itat. (1956) 44. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 323: SC, RS. Angely, Fl. Pter. (1963) 19: PR.

Distr. Geogr. Brasil: BA, GO, MT, MG (Ouro Preto), RJ (Serra dos Órgãos, Nova Friburgo, Itatiaia) SP (Alto da Serra, Rio Grande, Apiaí, Iporanga), PR, SC (Blumenau, Ilha de S. Catarina), RS (S. Leopoldo, S. Cruz). Amér. tropical e Central, Antilhas, Jamaica.

HEMITELIA R. Brown

1. **H. capensis** (L. f.) R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Hol. (1810) 158. Baker in Mart., Fl. Bras. (1870) 316. Brade in Rodriguésia (1937) 113: SP. Dutra, Pter. (1940) 27: RS. Brade in Rodriguésia (1942) 38: RJ, Itatiaia; (1951) 58, 65: SP. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 223: RJ. Brade, Itat. (1956) 24: + 1.000 m s.m.; 48: 1.700-1.900 m s.m., map. 2: (1960) 210: 1.700 - 2.100 m s.m., RS, ES, MG. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 325: SC, RS, Bras. austr., Africa austr., Java. Angely, Fl. Pter. (1963) 19: PR.

Polypodium capense L. f., Suppl. (1781) 445.

Distr. Geogr.: MG (Ouro Preto, Caparaó), ES, RJ (Serra dos Órgãos, Itatiaia), SP (Bocaina, Campos do Jordão), SC (Bom Retiro, Lages), RS (Sta. Cruz, Montalverne, S. Francisco de Paula). Africa austral, Java.

2. **H. setosa** (Kaulf.) Mett., Fil. Lech. 2 (1859) 30. Baker in Mart., Fl. Bras. (1870) 315, tab. 67, fig. 2. Sampaio, Pter. (1916) 44: MT. Dutra, Pter. (1940) 27: RS. Capurro, Catál. (1940) 78: Argentina. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia; (1947) 35: ES, MG, RS, Argentina. Rizzini in Arq. J. Bot. (1954) 223: RJ. Sehnem, Pter. Riogr. (1956) 325: SC, RS. Angely, Fl. Pter. (1963) 19: PR.

Alsophila setosa Kaulfuss, Enum. Fil. (1824) 249.

Distr. Geogr.: MT (Faz. S. José), MG, ES (Alto Limoeiro), RJ (Serra dos Órgãos, Itatiaia), PR, SC (Ilha de Sta. Catarina), RS (São Leopoldo, Osório, Sta. Cruz, Cruz Alta, Cachoeira). Argentina.

3. **H. Uleana** A. J. Sampaio in Pickel, Catál. (1938) 65: RJ. Brade in Rodriguésia (1942) 34: RJ, Itatiaia; Itat. (1956) 44.

Distr. Geogr.: RJ. (Itatiaia).

ERRATA

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
17	4	<i>Paniculatum</i>	<i>paniculatum</i>
17	25	<i>L. Inflexum</i>	L. inflexum
21	10	(Glaz.)	Glaz.
21	18	L. Saururus	<i>L. saurus</i>
21	28	L. Selago	<i>L. Selago</i>
27	22	<i>A. flexuosa</i>	A. flexuosa
31	3	<i>H. Crispum</i>	<i>H. crispum</i>
37	28	L. Var.	L. var.
39	26	C. Conifolia	C. conifolia